

หมวด	Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)								
แผนที่	6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)								
โครงการ	7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช								
ลักษณะ	เชิงปริมาณ								
ระดับการวัดผล	จังหวัด								
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน								
คำนิยาม	<p>การดูแลตามแนวทางมาตรฐาน หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย</p> <p>ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x จนถึงในปีงบประมาณ</p> <p>พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร</p>								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ปีงบประมาณ 62</td> <td>ปีงบประมาณ 63</td> <td>ปีงบประมาณ 64</td> </tr> <tr> <td>≥ ร้อยละ 60</td> <td>≥ ร้อยละ 65</td> <td>≥ ร้อยละ 70</td> </tr> </table>			ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 65	≥ ร้อยละ 70
ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64							
≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 65	≥ ร้อยละ 70							
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาที่ทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องทำให้ลดความรุนแรง และระยะเวลาการป่วยของโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้ำ								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>กรมสุขภาพจิต เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการ จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับบริการ 2) คำนำหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อำเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว)</p> <table border="1"> <tr> <td>จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง และมีค่าคะแนน 9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน</td> <td rowspan="2">X 100</td> </tr> <tr> <td>จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 เดือน</td> </tr> </table>			จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง และมีค่าคะแนน 9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	X 100	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 เดือน			
จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง และมีค่าคะแนน 9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	X 100								
จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 เดือน									

	<p>คำอธิบายสูตร:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตัวตั้ง คือ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการและมีค่าคะแนน $9Q < 7$ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ● ตัวหาร คือ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน 																								
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ																								
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนและมีค่าคะแนน $9Q < 7$ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน																								
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน																								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$																								
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 4																								
<p>เกณฑ์การประเมิน :</p> <p>ปี 2562 :</p> <table border="1" data-bbox="272 1263 1342 1368"> <tr> <td>รอบ 3 เดือน</td> <td>รอบ 6 เดือน</td> <td>รอบ 9 เดือน</td> <td>รอบ 12 เดือน</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>≥ ร้อยละ 60</td> </tr> </table> <p>ปี 2563 :</p> <table border="1" data-bbox="272 1420 1342 1525"> <tr> <td>รอบ 3 เดือน</td> <td>รอบ 6 เดือน</td> <td>รอบ 9 เดือน</td> <td>รอบ 12 เดือน</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>≥ ร้อยละ 65</td> </tr> </table> <p>ปี 2564 :</p> <table border="1" data-bbox="272 1576 1342 1682"> <tr> <td>รอบ 3 เดือน</td> <td>รอบ 6 เดือน</td> <td>รอบ 9 เดือน</td> <td>รอบ 12 เดือน</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>≥ ร้อยละ 70</td> </tr> </table>		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	-	-	≥ ร้อยละ 60	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	-	-	≥ ร้อยละ 65	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	-	-	≥ ร้อยละ 70
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน																						
-	-	-	≥ ร้อยละ 60																						
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน																						
-	-	-	≥ ร้อยละ 65																						
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน																						
-	-	-	≥ ร้อยละ 70																						
วิธีการประเมินผล :	รวบรวมข้อมูลผลการร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จากมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยการรับข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขเป็นรอบไตรมาส																								

เอกสารสนับสนุน :					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2559	2560	2561
	อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>1. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-352535 โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885 โทรสาร : 045-352514 E-mail : pat-ukn@yahoo.com</p> <p>2. แพทย์หญิงกนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทรศัพท์มือถือ : 08-0598-9191 Email: kako2518@yahoo.com</p>				
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	<p>ชื่อ-สกุล: นายวีระยุทธ มายุศิริ กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทรศัพท์มือถือ : 08-6991-0633 Email: Weerayut_mayusiri@hotmail.com</p>				